CISCO DENTAL
Jarred K Donald DDS

700 Conrad Hilton Blvd
Cisco, TX 76437
(254) 442-2000

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS

Después de Arestin® (antibiótico de aplicación local)

Atención preventiva · Cisco Dental — Dental Fitness

Justo después de su limpieza profunda, colocamos ARESTIN® — microesferas diminutas del antibiótico minociclina — directamente en las bolsas de las encías alrededor de dientes específicos. Se disuelven lentamente y siguen combatiendo durante semanas las bacterias de la enfermedad de las encías. Proteger ese medicamento donde lo colocamos, sobre todo durante la primera semana, es lo que hace que funcione.

★ La regla más importante

- NO use hilo dental, cepillos interdentales, palillos ni irrigador bucal en las áreas tratadas durante 10 días. El medicamento tiene que permanecer dentro de la bolsa para hacer su trabajo — limpiar entre esos dientes específicos demasiado pronto lo arrastra hacia afuera.
- Puede y debe seguir usando hilo dental y limpiando normalmente entre todos sus OTROS dientes.

Siga cepillándose — con suavidad

- Continúe cepillándose los dientes dos veces al día, incluidos los dientes tratados — solo sea suave justo en la línea de las encías de las áreas tratadas para no desprender las microesferas.
- Evite tocar las áreas tratadas con la lengua o los dedos.

Alimentación

- Durante 1 semana, evite masticar alimentos duros, crujientes o pegajosos (por ejemplo, zanahorias, nueces, caramelos masticables y chicle) con los dientes tratados.
- Mastique del otro lado cuando pueda, y prefiera alimentos más blandos durante el primer día o dos.

Lo que es normal

- Se espera sensibilidad o molestia leve a moderada en las encías durante la primera semana después de una limpieza profunda con Arestin, y desaparece por sí sola.
- Es posible que sienta brevemente un poco del material en la línea de las encías — eso es normal.

Por favor, avísenos

- ARESTIN es un antibiótico de la familia de las tetraciclinas. Avísenos de inmediato si está o podría estar embarazada, o si es alérgico(a) a las tetraciclinas.
- Llame al (254) 442-2000 si tiene dolor o hinchazón que empeora después de unos días, o cualquier señal de reacción alérgica — picazón, sarpullido, ronchas o hinchazón. Si tiene cualquier dificultad para respirar, llame al 911.

Información educativa para nuestros pacientes — no sustituye la orientación individual que el Dr. Donald le brinda para su atención. Si tiene dudas, llámenos.