CISCO DENTAL
Jarred K Donald DDS

700 Conrad Hilton Blvd
Cisco, TX 76437
(254) 442-2000

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS

Después de una corona o un puente

Restaurativa · Cisco Dental — Dental Fitness

Restaurar un diente con una corona, o reemplazar dientes perdidos con un puente, devuelve fuerza y función. Si se colocó una restauración temporal mientras se fabrica la definitiva, la clave es protegerla hasta que regrese.

Cuidado de una corona o puente temporal

- Las restauraciones temporales se fijan con un cemento suave para que podamos retirarlas fácilmente en su próxima visita — trátelas con cuidado.
- Evite los alimentos pegajosos (chicle, caramelo, caramelos masticables) y duros (hielo, nueces, dulces duros) que pueden aflojar o romper una restauración temporal.
- Al limpiar entre los dientes, saque el hilo dental hacia un lado en lugar de jalarlo hacia arriba, para no levantar la restauración temporal.
- Si se le cae la restauración temporal, guárdela y llame al (254) 442-2000 — por lo general se vuelve a cementar rápidamente y evita que el diente se mueva.

Sensibilidad y comodidad

- Es normal cierta sensibilidad a la temperatura y a la presión durante algunos días después de colocar la restauración temporal o la definitiva.
- Un antiinflamatorio de venta libre como el ibuprofeno, tomado según la etiqueta, suele ser todo lo que se necesita.

Después de cementar la corona o el puente definitivo

- Puede comer normalmente cuando haya pasado la anestesia, aunque le sugerimos ir introduciendo los alimentos más duros poco a poco durante el primer día.
- Si siente la mordida alta o dispareja después de que pase la anestesia, llámenos para un ajuste rápido.
- Limpie diariamente debajo del diente de reemplazo del puente con un enhebrador de hilo dental o un irrigador bucal — le enseñaremos cómo; esto es lo que hace que un puente dure.

Información educativa para nuestros pacientes — no sustituye la orientación individual que el Dr. Donald le brinda para su atención. Si tiene dudas, llámenos.

700 Conrad Hilton Blvd
Cisco, TX 76437
(254) 442-2000

Cuándo llamarnos

Llame a nuestro consultorio al (254) 442-2000 si presenta cualquiera de los siguientes síntomas:

- Sangrado que no disminuye después de 45–60 minutos de presión constante
- Hinchazón que empeora después del tercer día en lugar de mejorar
- Fiebre, escalofríos, o un mal sabor u olor que no desaparece
- Dolor que aumenta después del día 3, o que no se controla con el plan indicado
- Cualquier reacción a un medicamento recetado (sarpullido, ronchas, dificultad para respirar — si tiene dificultad para respirar, llame al 911)

Información educativa para nuestros pacientes — no sustituye la orientación individual que el Dr. Donald le brinda para su atención. Si tiene dudas, llámenos.