CISCO DENTAL
Jarred K Donald DDS

700 Conrad Hilton Blvd
Cisco, TX 76437
(254) 442-2000

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS

Cuidado de dentaduras completas y parciales

Restaurativa · Cisco Dental — Dental Fitness

Una dentadura nueva o recién ajustada toma tiempo para sentirse como propia. Las primeras semanas son un periodo de aprendizaje para sus músculos y tejidos — la paciencia y el uso constante son lo que convierte un aparato nuevo en uno cómodo.

El periodo de adaptación

- Al principio, espere más saliva, una sensación de llenura y algo de dificultad al hablar — todo es normal y temporal.
- Es común que aparezcan puntos adoloridos mientras la dentadura se asienta. No la ajuste usted mismo; llámenos y aliviaremos el punto en minutos.
- Practique leer en voz alta para hablar con claridad más pronto, y comience con alimentos blandos cortados en trozos pequeños, masticando de ambos lados por igual.

Cuidado diario

- Quítese y enjuague la dentadura después de las comidas. Cepíllela diariamente con un cepillo para dentaduras y un limpiador no abrasivo (no use pasta de dientes regular, que la raya).
- Cepíllese las encías, la lengua y cualquier diente que le quede todos los días para mantener sano el tejido.
- Manipule la dentadura sobre una toalla doblada o sobre un lavabo con agua para que no se rompa si se le cae.

Durante la noche

- A menos que le indiquemos lo contrario, quítese la dentadura por la noche para que sus tejidos descansen, y guárdela en agua o en solución para dentaduras para que no se seque ni se deforme.

Mantener el ajuste

- Sus encías y su hueso cambian de forma con el tiempo, por lo que las dentaduras necesitan rebases o ajustes periódicos — acuda a sus revisiones aunque todo se sienta bien.

Información educativa para nuestros pacientes — no sustituye la orientación individual que el Dr. Donald le brinda para su atención. Si tiene dudas, llámenos.

700 Conrad Hilton Blvd
Cisco, TX 76437
(254) 442-2000

Cuándo llamarnos

Llame a nuestro consultorio al (254) 442-2000 si presenta cualquiera de los siguientes síntomas:

- Sangrado que no disminuye después de 45–60 minutos de presión constante
- Hinchazón que empeora después del tercer día en lugar de mejorar
- Fiebre, escalofríos, o un mal sabor u olor que no desaparece
- Dolor que aumenta después del día 3, o que no se controla con el plan indicado
- Cualquier reacción a un medicamento recetado (sarpullido, ronchas, dificultad para respirar — si tiene dificultad para respirar, llame al 911)

Información educativa para nuestros pacientes — no sustituye la orientación individual que el Dr. Donald le brinda para su atención. Si tiene dudas, llámenos.