CISCO DENTAL
Jarred K Donald DDS

700 Conrad Hilton Blvd
Cisco, TX 76437
(254) 442-2000

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS

Después de un empaste de resina (composite)

Restaurativa · Cisco Dental — Dental Fitness

Su empaste del color del diente queda completamente endurecido antes de que se vaya, así que puede masticar en cuanto pase la anestesia. Un poco de sensibilidad mientras el diente se adapta es normal y casi siempre temporal.

Mientras sigue anestesiado

- Espere a que regrese por completo la sensibilidad (por lo general 2–3 horas) antes de comer para no morderse la mejilla, el labio o la lengua.

Sensibilidad

- Es normal una sensibilidad leve al frío, a la presión o a lo dulce durante algunos días — a veces un par de semanas — mientras el diente se recupera.
- Un antiinflamatorio de venta libre como el ibuprofeno, tomado según la etiqueta, ayuda si es necesario.

Su mordida

- Si siente el empaste alto o la mordida 'desajustada' cuando pase por completo la anestesia, llámenos — un ajuste rápido y sin dolor evita molestias y protege el empaste.

Cuidado diario

- Cepíllese y limpie entre los dientes normalmente.
- Los empastes de resina no se manchan fácilmente, pero limitar el café, el té, el vino tinto y el tabaco mantiene todo con su mejor aspecto.

Cuándo llamarnos

Llame a nuestro consultorio al (254) 442-2000 si presenta cualquiera de los siguientes síntomas:

- Sangrado que no disminuye después de 45–60 minutos de presión constante
- Hinchazón que empeora después del tercer día en lugar de mejorar
- Fiebre, escalofríos, o un mal sabor u olor que no desaparece
- Dolor que aumenta después del día 3, o que no se controla con el plan indicado
- Cualquier reacción a un medicamento recetado (sarpullido, ronchas, dificultad para respirar — si tiene dificultad para respirar, llame al 911)

Información educativa para nuestros pacientes — no sustituye la orientación individual que el Dr. Donald le brinda para su atención. Si tiene dudas, llámenos.